

# Bilan ornithologique 2016


## Département de l'Aveyron



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AVEYRON

# Statistiques


## Nb de données annuelles



AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AVEYRON

# Statistiques

## Nb de données mensuelles en 2016




# Statistiques

Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés :

- Viadène
- Bassin de Decazeville
- Ségala
- Lévézou
- Sud-ouest du département




Localisation des données 2016



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

## Nb espèces annuelles (hors sp.)



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques


## Espèces les plus notées en 2016

1.	Buse variable	11.	Mésange bleue
2.	Merle noir	12.	Héron cendré
3.	Pinson des arbres	13.	Pigeon ramier
4.	Corneille noire	14.	Milan noir
5.	Faucon crécerelle	15.	Troglodyte mignon
6.	Mésange charbonnière	16.	Pic vert
7.	Rougegorge familier	17.	Chardonneret élégant
8.	Milan royal	18.	Moineau domestique
9.	Fauvette à tête noire	19.	Canard colvert
10.	Geai des chênes	20.	Hirondelle rustique



# Statistiques


## Nb d'observateur (>2 données)



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques


## Nb communes >10 données



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

Nb communes = 0 donnée



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Statistiques

Communes les plus prospectées en 2016	
1.	Najac
2.	Drulhe
3.	Montlaur
4.	Millau
5.	Luc-la-Primaube
6.	Villeneuve
7.	Saint-Affrique
8.	Espalion
9.	Salles-la-Source
10.	La Loubière

Communes les moins prospectées en 2016	
1.	Saint-Santin
2.	Saint-Christophe-Vallon
3.	Martrin
4.	Escandolières
5.	Cabanès
6.	Brandonnet
7.	Cassuéjous
8.	Saint-Félix-de-Lunel
9.	Auriac-Lagast
10.	Camboulazet



# Espèces

- Tadorne de Belon : max de 21 le 27 novembre à Salles-Curan (A. Hardy). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Canard souchet : max de 32 le 20 octobre à Privezac (E. Gilhodes, A. Maury-Dalmazane). *Groupe le plus important en Aveyron depuis 1996.*
- Nette rousse : 10 mâles le 22 juin à Saint-Chély-d'Aubrac (S. Talhoët). 3 en *plumage nuptial* et 7 en *plumage internuptial* : *probablement en dispersion post-reproduction.*



© R. Straughan



# Espèces

- Harle bièvre : 1 à 5 ind. du 8 janvier au 24 juillet dans la vallée du Tarn (G. Marceney, A. Hardy, N. Alric) puis 2 femelles du 22 au 30 décembre à Pareloup (B. Long, T. Andrieu et *al.*). *Toujours les oiseaux du Tarn (repro en 2015).*



© N. Alric



© N. Alric


- Plongeon imbrin : 1 2<sup>ème</sup> année le 25 janvier à Canet-de-Salars (S. Talhoët).  
Plongeon le plus « commun » en Aveyron : 7<sup>ème</sup> hiver où l'espèce est notée depuis 1996 (toutes sur le lac de Pareloup).



# Espèces

- Crabier chevelu : max de 3 ind. le 19 mai à Laissac (S. Talhoët). Groupe le plus important en Aveyron. La 1<sup>ère</sup> observation en Aveyron date de 2008. Devenu presque annuel depuis !
- Grande Aigrette : Max de 51 ensembles le 3 février à Druelle (N. Bidron). Groupe le plus important en Aveyron. Espèce toujours en augmentation (groupes de plus en plus importants).

## Effectifs maximal par groupe



# Espèces

- Bondrée apivore : 4 356 migrants à Roquecezière du 20 août au 10 septembre. *Effectifs records sur le site depuis le début du suivi. Max noté en 2015 avec 3 214 ind. pour une moyenne annuelle (2006 – 2016) de 2 507 ind.*



- Busard des roseaux : 1<sup>er</sup> le 11 mars à Gissac (R. Straughan). *Date la plus précoce en Aveyron (11 mars 2001 à Peyrusse-le-Roc, D. Escande, J.C. Issaly ; 11 mars 2003 à Saint-Affrique, A. Comby).*
- Busard pâle : 1 mâle adulte le 10 avril à Najac (J.L. Cance). *3<sup>ème</sup> donnée aveyronnaise (et 1<sup>ère</sup> printanière).*



# Espèces

- Aigle hybride pomarin x criard : 1 ind. de 2<sup>ème</sup> année – 8 octobre – Balise GPS
  - Individu né d'une femelle d'Aigle pomarin et d'un mâle d'Aigle criard en Lituanie en 2015.
  - Quitte la Lituanie le 25/09/2016.
  - Arrive à 10h52 par la commune de Pomayrols et quitte à 15h56 par la commune de Murasson.
  - Migration active toute la journée (sauf stationnement de 11h21 à 13h58, commune de Recoules-Prévinquières).
  - Il est passé notamment au dessus de la tourbière des Rauzes, des éoliennes de Castelnaud-Pégayrols et de la boucle du Cambon (Saint-Affrique).



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Outarde canepetière : 1 type femelle le 16 septembre à Flavin (T. Blanc, L. Campourcy, H. Bessières). *Halte migratoire dans un regroupement d'Ædicnèmes criards.*
- Avocette élégante : 1 ind. le 16 mai à Balsac (T. Andrieu). *8<sup>ème</sup> donnée aveyronnaise, la dernière remontant à mars 2010.*
- Grand Gravelot : max de 11 ind. le 12 mai à Saint-Laurent-de-Lévézou (S. Talhoët). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Bécassine sourde : 1 ind. le 17 janvier au Clapier (F. Legendre). *Espèce rarement observée mais sans doute beaucoup plus commune qu'on ne le pense !*



© T. Andrieu



# Espèces

➤ Chevalier aboyeur :

- Les 3 derniers le 2 novembre à Montézic (G. Alric). *Date la plus tardive en Aveyron.*
- Max de 21 ind. le 27 avril à Soulages-Bonneval (S. Talhoët, G. Alric). *Groupe le plus important en Aveyron.*



- Chevalier guignette : max de 36 ind. le 27 avril à Sainte-Eulalie-d'Olt (P. Dréno). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Mouette pygmée : 1 ad et 1 juv. le 25 novembre à Salles-Curan (S. Talhoët). *Espèce non revue en Aveyron depuis novembre 2011.*



# Espèces

- Mouette mélanocéphale : 1 juv. le 9 août à Salles-Curan (T. Vellard), 1 juv. le 10 août au Viala-du-Tarn (R. Straughan, R. Nadal, G. Marceny). *La 1<sup>ère</sup> observation en Aveyron date de 2008. Devenue presque annuelle depuis !*

© R. Straughan



- Sterne pierregarin : 1 le 25 avril à Luc-la-Primaube (V. Prudhomme), 1 le 21 mai à Balsac (T. Andrieu). *6<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> donnée en Aveyron.*

© V. Prudhomme



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Coucou gris : 1<sup>ères</sup> informations sur les espèces parasitées par le Coucou gris en Aveyron :
  - Un jeune nourrit par un couple de Tarier pâtre le 17 juin à Saint-Georges-de-Luzençon (S. Talhoët).
  - Un jeune nourrit par un couple de Tarier pâtre le 26 juin à Millau (B. Long).
- Hibou des marais : 1 le 19 janvier à Onet-le-Château (P. Defontaines), 1 le 28 janvier à Sévérac-le-Château (F. Legendre), 1 le 31 janvier à La Cavalerie (O. Duriez).  
*Hivernage classique.*
- Torcol fourmilier : 1<sup>er</sup> le 7 mars à Mostuéjols (L. Espla). *Date la plus précoce en Aveyron.*



© L. Espla



# Espèces

- Hirondelle de fenêtre : 1<sup>ère</sup> le 9 février à Entraygues-sur-Truyère (F. Livet). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Bergeronnette d'Italie (*Motacilla flava cinereocapilla*) : 1 mâle le 12 mai à Saint-Laurent-du-Lévézou (S. Talhoët). 5<sup>ème</sup> donnée aveyronnaise. *Une meilleure attention est portée par les observateurs aux sous-espèces de Bergeronnette printanière depuis quelques années.*
- Bergeronnette flavéole (*Motacilla flava flavissima*) : 1 mâle le 28 mars 2016 à Privezac (A. Amiel), 1 mâle le 2 avril à Soulages-Bonneval (S. Talhoët), 1 mâle le 27 avril à Saint-Affrique (V. Romera). *Même remarque.*




© S. Talhoët



# Espèces

- Gorbebleue à miroir : 1 mâle les 22 et 23 mars à Decazeville (P. Bounie, A. Amiel), 1 femelle le 28 mars à Salles-Courbatiès (A. Amiel). *Dates et lieux désormais classiques pour l'espèce.*



© B. Long



- Grive litorne : 1 ind. le 12 mai à Saint-Léons (S. Talhoët). *1<sup>ère</sup> observation sur le Lézou en période de reproduction (nicheuse sur l'Aubrac).*



# Espèces

➤ Cisticole des joncs : Très nombreuses observations et 1<sup>ères</sup> reproductions certaines en Aveyron :

- Mélagues le 4 août (F. Legendre) à 910 m d'altitude.
- Saint-Léons le 31 août (L. Carrié) à 838 m d'altitude (présence notée sur le site à partir du 27 juillet alors qu'elle était absente jusqu'au 4 juillet).



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Rousserolle effarvatte : 1<sup>ère</sup> le 30 mars à Decazeville (J.L. Cance). *Date la plus précoce en Aveyron (3 semaines d'avance !).*
- Rousserolle turdoïde : 1 chanteur le 10 mai à Mostuéjous (L. Espla). *Halte migratoire au bord du Tarn. Espèce mentionnée dans les années 1980 dans le Villefranchois, la vallée du Tarn et le Lévézou mais sans plus de précisions. Aucune observation depuis !*
- Pinson du Nord : Dernier le 20 avril à Drulhe (E. Gilhodes). *Date la plus tardive en Aveyron.*



© E. Gilhodes



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Espèces

- Venturon montagnard : 1 le 31 mars à Saint-André-de-Vézines (N. Trouverie), 2 le 27 novembre à Mélagues (R. Besançon, P. Besançon). *L'observation de mars est la plus tardive en Aveyron. Lieux classiques pour l'espèce.*



© J.C. Peers

- Sizerin flammé ou Sizerin cabaret ? : 1 le 19 février à Sébazac-Concourès (J.C. Peers, C. Cabailh).  
*Distinction difficile entre les deux :*
  - manteau brun : Sizerin cabaret
  - barre alaire blanche : Sizerin flammé

- Bruant mélanocéphale : 1 mâle adulte le 19 juin à Millau (J.M. Carel).  
*3<sup>ème</sup> donnée aveyronnaise.*



© J.M. Carel



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ  
AVEYRON

# Informations relatives au baguage

- Cigogne blanche : 33 les 21 et 22 avril à Onet-le-Château . De nombreux individus bagués mais seulement 2 lus entièrement :
  - 1 baguée poussin le 05/06/2015 en Allemagne. Distance : 824 km, port de bague : 321 jours.
  - 1 baguée poussin le 28/06/2015 en Allemagne. Distance : 667 km, port de bague : 298 jours.
- Cigogne blanche : 30 le 18 août à Roquefort-sur-Soulzon. Un individu s'électrocute sur un pylône Haute Tension :
  - Individu bagué aux Pays-Bas (en attente de précisions).
- Milan royal : plusieurs individus suisses équipés de balises GPS localisés en Aveyron lors de l'hiver 2016-2017. Un ind. bagué poussin au nid le 15/06/2016 à Rechthalten (Suisse) est retrouvé mort le 30 décembre à Camarès (prédation Grand-duc d'Europe).

