

Bilan ornithologique 2017

Département de l'Aveyron



Faucon émerillon © J.P. Ladoux



Grosbec casse-noyaux © A. Lulek




Bécasseau variable © G. Alric



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Statistiques


Nombre de données



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Statistiques

Nombre de données mensuelles en 2017




AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Statistiques

Bonne couverture du département

Quelques secteurs moins prospectés :

- Bassin de Decazeville / Conques
- Ségala
- Lévézou
- Sud-ouest du département




Localisation des données 2017



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Statistiques

Nombre d'espèces (hors indéterminées)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Statistiques


Espèces les plus notées en 2017

1.	Merle noir	11.	Geai des chênes
2.	Pinson des arbres	12.	Faucon crécerelle
3.	Buse variable	13.	Milan noir
4.	Rougegorge familier	14.	Chardonneret élégant
5.	Mésange charbonnière	15.	Troglodyte mignon
6.	Corneille noire	16.	Moineau domestique
7.	Mésange bleue	17.	Héron cendré
8.	Fauvette à tête noire	18.	Pouillot véloce
9.	Milan royal	19.	Sittelle torchepot
10.	Pigeon ramier	20.	Pic vert



Statistiques


Nombre d'observateur (≥ 1 donnée)



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON


Statistiques

Nombre de communes (n=304) ≥ 10 données



Statistiques

Nombre de communes (n=304) = 0 donnée



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Statistiques

Communes les plus prospectées en 2017	
1.	Montlaur
2.	Millau
3.	Najac
4.	Montrozier
5.	Espalion
6.	Villeneuve
7.	Drulhe
8.	La Loubière
9.	Creissels
10.	Salles-la-Source

Communes les moins prospectées en 2017	
1.	La Serre
2.	Saint-Félix-de-Lunel
3.	Pruines
4.	Murols
5.	Saint-Just-sur-Viaur
6.	Saint-Jean-d'Alcapiès
7.	Meljac
8.	Les Albres
9.	Vitrac-en-Viadène
10.	Camjac



Espèces

- Canard pilet : max. de 27 ind. le 8 mars à Privezac (S. Talhoët). 2^{ème} groupe le plus important en Aveyron.
- Macreuse brune : 1 à 8 ind. du 5 janvier au 29 mars à Villefranche-de-Panat (J.M. Cugnasse, S. Talhoët, T. Andrieu). Groupe le plus important en Aveyron avec un stationnement prolongé. Espèce non revue depuis 2009.
- Garrot à œil d'or : 3 mâles le 9 mars à Sainte-Geneviève-sur-Argence (N. Bidron). 5^{ème} observation en Aveyron. Espèce non revue depuis 2011.



© J.M. Cugnasse



© N. Bidron



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Espèces

- Harle bièvre : 2 m. et 4 f. du 1^{er} janvier au 8 mars (G. Marceny, A. Hardy, N. Alric, J.M. Cugnasse), 1 f. et 3 juv. du 21 juin au 15 juillet (G. Marceny, A. Rhodde, A. Hardy) puis 1 à 6 ind. (dont 5 m. et 1 f.) du 14 novembre au 5 décembre (E. Vors, A. Hardy). 2^{ème} reproduction en Aveyron après celle de 2015.

Autres observations : 2 f. le 7 janvier à Pareloup (S. Talhoët) et 1 m. et 1 f. le 2 février à Saint-Symphorien-de-Thénières (T. Andrieu).



© N. Alric



© E. Vors



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON


Espèces

- Caille des blés : 2 ind. les 22, 23 et 25 octobre à Drulhe (E. Gilhodes). *Dates les plus tardives en Aveyron.*
- Butor étoilé : 1 ind. le 19 octobre à Rodelle (M. Lavastrou). 10^{ème} observation en Aveyron.
- Blongios nain : 1 femelle ou jeune le 4 juillet à Villeneuve (P. Le Maréchal). 3^{ème} observation en Aveyron. *Reproduction ou dispersion post-nuptiale ?*
- Aigrette garzette : Max. de 10 ind. le 16 septembre à Soulages-Bonneval (S. Talhoët). *Groupe le plus important en Aveyron.*
- Cigogne blanche : Max. de 145 ind. le 27 août à L'Hospitalet-du-Larzac (R. Riols) puis 134 ind. comptés le soir même à Saint-Félix-de-Sorgues où elles passent la nuit (R. Straughan), sans doute le même groupe. *Groupe le plus important en Aveyron.*
Autre observation intéressante, 1 ind. stationne du 20 août au 17 octobre sur les commune de Flavin et Luc-la-Primaube (F. Hot, T. Blanc).



Espèces

- Spatule blanche : 1 ind. le 21 mars à Villefranche-de-Rouergue (D. Grès). 4^{ème} observation en Aveyron. Espèce non revue depuis 2011.
- Flamant rose : 1 ind. le 4 mars à Montézic (G. Alric). 4^{ème} observation en Aveyron. Espèce non revue depuis 2008.
- Aigle criard : individu « Tonn » équipé d'une balise Argos
 - migration prénuptiale : noté le 25 mars à Pierrefiche ;
 - migration postnuptiale : noté le 4 décembre à Balaguier-d'Olt, Montsalès et Ols-et-Rinhodes.



Espèces

➤ Aigle de Bonelli : 2 ind. le 26 mars à Lescure-Jaoul (D. Ginestet) et un 1^{er} année le 22 août à Laval-Roquecezière (B. Long, L. Carrié).

➤ Faucon kobez : 1 mâle de 2^{ème} année les 25 et 29 août à Rebourguil et Belmont-sur-Rance (B. Long). *Espèce peu observée lors de la migration postnuptiale en Aveyron.*



© B. Long

➤ Marouette ponctuée : 1 ind. le 22 mars à Decazeville (J.L. Cance). 4^{ème} individu observé en Aveyron (tous entre le 18 mars et le 10 avril).



Espèces

- Huïtrier pie : 1 ind. le 9 avril à Alrance (F. Claraz). 2^{ème} observation en Aveyron, la 1^{ère} remontant à avril 1998 (Pareloup, G. Champion) !
- Echasse blanche : 2 ind. le 10 juin à Montlaur (R. Straughan). Date la plus tardive en Aveyron.
- Petit Gravelot : Max. 16 ind. le 19 mars à Soulages-Bonneval (G. Alric). Groupe le plus important en Aveyron.
- Pluvier guignard : 2 ind. le 22 août à Saint-Laurent-de-Lévézou (A. Rhodde) et 2 ind. le même jour à Laguiole (G. Alric, P. Ayrat). 1 ind. le 8 septembre à La Loubière (M. Trille). Espèce non vue annuellement en Aveyron mais pas forcément recherchée !




© G. Alric



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Espèces

- Combattant varié : le dernier le 6 octobre à Privezac (P. Bounie). *Date la plus tardive en Aveyron.*
- Bécassine sourde : 1 ind. le 19 septembre à Rignac (E. Gilhodes). *Date la plus précoce en Aveyron.* 1 ind. le 12 octobre à Decazeville (J.L. Cance), 1 ind. le 22 octobre à Saint-Léons (B. Long), 1 ind. le 22 octobre à Saint-Laurent-de-Lévézou (B. Long) et 1 ind. le 28 octobre à Onet-le-Château (B. Long). *5 observations en 2017 car espèce recherchée !*
- Bécassine des marais : la dernière le 1^{er} mai à Privezac (A. Amiel). *Date la plus tardive au printemps en Aveyron.*



© G. Deltort



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Espèces

- Chevalier gambette : le dernier le 16 septembre à Soulages-Bonneval (S. Talhoët). *Date la plus tardive en Aveyron.*
- Coucou gris : le 1^{er} le 4 mars à Espalion (Y. Angoy). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Hirondelle rustique : la dernière le 16 novembre à Villeneuve (A. Amiel). *Date très tardive en Aveyron.*
- Hirondelle rousseline : 1 ind. le 4 mai à La Loubière (S. Talhoët). 5^{ème} observation en Aveyron. *Espèce non revue depuis 2011.*
- Pipit rousseline : le 1^{er} le 4 avril à Sainte-Eulalie-de-Cernon (M. Trille). *Date la plus précoce en Aveyron.*



© C. Dassonville



Espèces

- Accenteur alpin : le 1^{er} automnal le 15 octobre à Mostuéjols (S. Combaud). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Gorbebleue à miroir : 1 mâle les 22 et 24 mars à Decazeville (J.L. Cance, E. Gilhodes), 1 mâle le 29 mars à Roquefort-sur-Soulzon (M. Leclaire) et 1 ind. le 15 septembre à Decazeville (J.L. Cance). *Espèce devenue d'observation annuelle en Aveyron depuis 2009.*
- Traquet motteux : le dernier le 16 novembre à La Loubière (P. Ayrat). *Date la plus tardive en Aveyron.*






© A. Hardy



Espèces

- Grive litorne : découverte des premiers nids en Aveyron :
 - 1 couveur dans un frêne le 28 avril à Cantoin (M. Trille) ;
 - 1 couveur dans un frêne le 24 mai à Lacalm (S. Talhoët).

- Cisticole des joncs : Très nombreuses observations (dans la foulée de 2016)
Essentiellement dans le Rougier de Camarès, le Saint-Affricain, le Millavois et le Villefranchois .




AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Espèces

- Locustelle tachetée : la dernière du passage prénuptial le 21 mai à Camarès (A. Hardy). *Date printanière la plus tardive en Aveyron.*
- Phragmite des joncs : 1 ind. le 28 avril à Decazeville (J.L. Cance). *Date printanière la plus tardive en Aveyron.*
- Rousserolle effarvatte : 1^{ère} du passage postnuptial le 3 août à Saint-Chély-d'Aubrac (S. Talhoët) (*date la plus précoce en Aveyron*) et dernière du passage postnuptial le 13 octobre à Decazeville (P. Bounie) (*date la plus tardive en Aveyron*).
- Fauvette passerinette : 1^{ères} obs. sur le causse Comtal depuis 1995 : 1 mâle le 8 mai à Rodelle (A. Rhodde) et 1 mâle le 18 mai à La Loubière (S. Talhoët) à 2 km l'une de l'autre. *Extension de l'aire géographique de l'espèce ?*



© A. Rhodde



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Espèces


- Pouillot ibérique : 1 ind. chanteur du 21 mai au 9 juin à Saint-Saturnin-de-Lenne (S. Talhoët, B. Long, F. Legendre et *al.*). 1^{ères} mentions en Aveyron. 🔊
- Tichodrome échelette : le 1^{er} le 7 octobre à Millau (M. Trille). *Date la plus précoce en Aveyron.*
- Rémiz penduline : 2 ind. le 22 mars puis 7 ind. le 24 mars à Decazeville (J.L. Cance, E. Gilhodes). *Dates les plus précoces du passage prénuptial en Aveyron et groupe le plus important. De nouveau 2 ind. le 12 octobre à Decazeville (J.L. Cance). Date la plus précoce du passage postnuptial.*
- Venturon montagnard : 4 ind. le 26 décembre à Condom-d'Aubrac (P. Ayrat). *Espèce non annuelle en Aveyron.*



© E. Gilhodes



Espèces

- Tarin des aulnes : 1 ind. le 12 août à Aurelle-Verlac (T. Williamson). 1^{ère} observation estivale en Aveyron. Oiseau se reproduisant en Lozère ou dans le Cantal en dispersion ?
- Sizerin cabaret : 4 ind. le 15 décembre puis 8 ind. le 26 décembre à Saint-Santin (D. Wagenmann). Hivernage important en France lors de l'hiver 2017-2018. Plusieurs autres observations ont été réalisées en janvier et février 2018 en Aveyron.
- Bouvreuil trompette : 1 femelle le 27 novembre à Saint-Salvadou (A. Amiel). 6^{ème} donnée aveyronnaise. Il s'agit de la sous-espèce « pyrrhula » du Bouvreuil pivoine au cri caractéristique. 



© S. Michelin



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Informations relatives au baguage

➤ Cigogne blanche :

- Sur les 134 ind. qui ont passées la nuit du 27 août à Saint-Félix-de-Sorgues, les bagues de 11 ind. ont pu être lues entièrement : 1 baguée poussin en Allemagne en 2015 et 10 baguées poussins en Allemagne en 2017.
- 1 baguée poussin le 14 juin 2014 en Allemagne est observée le 10 septembre à La Cavalerie.
- 1 baguée poussin aux Pays-Bas (demande en cours pour la date et le lieu précis) est présente du 20 août au 17 octobre sur les commune de Flavin et Luc-la-Primaube (F. Hot, T. Blanc).



© F. Hot



Informations relatives au baguage

- Milan royal : 3 ind. bagués en dehors de l'Aveyron :
 - Une femelle baguée adulte en juillet 2010 dans le Cantal est retrouvée morte le 24 janvier à Rodelle (prédation) (S. Braley).
 - Un ind. bagué poussin en juin 2015 en Allemagne est observé le 14 juillet à Aurelle-Verlac (M. Combret).
 - Un ind. bagué poussin en juin 2015 dans le Cantal est observé le 28 juillet à Théronnels (J.P. Ladoux).

- Accenteur alpin : Un ind. bagué adulte le 28 novembre 2015 en Espagne est photographié le 1^{er} novembre à Saint-Rome-de-Cernon (R. Straughan).
1^{ère} info de baguage pour cette espèce en Aveyron.



© J.P. Ladoux



© R. Straughan



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON

Merci de votre attention



© T. Vergely



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AVEYRON